

**MONITORAMENTO DA COBERTURA FLORESTAL DA
AMAZÔNIA POR SATÉLITES**

AVALIAÇÃO DETER – JUNHO DE 2009

**INPE – COORDENAÇÃO GERAL DE OBSERVAÇÃO DA TERRA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 03 DE AGOSTO DE 2009**

1. INTRODUÇÃO

O DETER - Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real identifica e mapeia áreas desflorestadas em formações florestais na Amazônia. Esse sistema utiliza imagens dos sensores MODIS, a bordo do satélite TERRA, da NASA, e imagens do WFI, a bordo do satélite brasileiro CBERS-2B do INPE. Esses sensores cobrem a Amazônia com alta frequência temporal, de dois e cinco dias, respectivamente, mas com resolução espacial limitada de 250 metros e 260 metros (WFI). Detalhes sobre a metodologia utilizada pelo DETER podem ser encontrados na página do DETER (http://www.obt.inpe.br/deter/metodologia_v2.pdf).

Como claramente explícito na metodologia, é importante ressaltar que o DETER é uma ferramenta concebida para dar suporte à fiscalização e não para fornecer um mapa fiel do desmatamento mensal da Amazônia. Isso é devido à resolução pouco detalhada dos satélites utilizados e à cobertura de nuvens, variável de um mês para outro. A vantagem desse sistema está na rapidez com que o DETER é capaz de detectar novos desflorestamentos, possibilitando gerar em um curto período de tempo, dados para a fiscalização. Essa agilidade dá a possibilidade de conter os desmatamentos antes que o mesmo tenha se completado.

A qualificação dos dados do DETER tem como objetivo caracterizar os dados de desmatamento (Alerta) referentes às duas quinzenas de cada mês. Para a qualificação, faz-se uso de imagens provenientes de sensores a bordo dos satélites Cbers e Landsat, adquiridas em período equivalente ao das Imagens Modis, com resolução espacial mais fina, de 20 e 30 m, respectivamente.

A qualificação do DETER é amostral, ou seja, apenas uma parte dos Alertas é avaliada. O tamanho da área amostrada e sua representatividade variam a cada mês de acordo com as condições atmosféricas e a disponibilidade de imagens de média resolução. No período seco, em geral, a área amostrada é maior do que no período chuvoso, quando grande parte da região permanece sob nuvens. Desta

forma, a qualificação dos Alertas não pode ser vista como um mapeamento mais detalhado do DETER, pois não é possível assegurar uma área mínima a ser amostrada mês a mês.

O DETER mapeia tanto o desmatamento por corte raso quanto as áreas em processo de desmatamento por alteração da cobertura florestal. Como grande parte dessas alterações só é percebida quando há uma alta intensidade de perturbação, a esse tipo de desmatamento denominamos degradação florestal progressiva. Áreas de manejo florestal de baixo impacto, em geral, não são detectadas por esse sistema.

Na qualificação dos desmatamentos, os Alertas são sobrepostos às imagens de resolução espacial mais fina e então são classificados como Corte Raso ou Degradação Florestal de Intensidade Leve, Alta ou Moderada. Nessa avaliação os Alertas não confirmados como desmatamento também são contabilizados. O esquema de classificação é sistematizado e apresentado na Figura 1.




Figura 1. Esquema de Classificação dos dados de Alerta do DETER. As classes finais são representadas pelas caixas verdes: 1) Não confirmado como desmatamento (a); 2) Corte Raso; 3) Degradação Florestal de Intensidades Leve, Moderada e Alta (b).

O desmatamento por corte raso é o processo de remoção total da cobertura florestal em um curto intervalo de tempo. Esse processo é caracterizado nas imagens pela predominância de solo exposto com textura lisa e limites bem definidos entre a área desmatada e a matriz florestal.

Na Figura 2 são apresentados os critérios de foto-interpretação. Os padrões e tipos de cobertura da terra observados nas imagens que definem as classes dos diferentes processos de desmatamento.

O desmatamento por degradação florestal progressiva é um processo gradativo, no qual se observa a perda parcial e contínua da cobertura florestal. Esse processo é caracterizado pela combinação da floresta com uma ou mais classes de cobertura da terra como solo exposto, cicatriz de fogo florestal e floresta secundária. A proporção dessas classes no polígono do Alerta, bem como sua frequência, densidade e arranjo espacial indica a intensidade de degradação classificada como Leve, Moderada ou Alta.

A escolha de imagens para a qualificação dos Alertas baseia-se no número de Alertas por cena, na existência de imagens TM/Landsat ou Cbers de boa qualidade para o período e, no seu percentual de cobertura de nuvens. Imagens dos anos anteriores são utilizadas como dado auxiliar durante a foto-interpretação.






Imagem TM/Landsat 2008	Crítérios de Interpretação visual Landsat/TM RGB 543	Cobertura da Terra	Processo de desmatamento
	Predomínio de tonalidade verde, textura rugosa e sombra. Padrão semelhante às florestas da região. Maioria do perímetro contíguo tem o mesmo padrão.	Cobertura florestal , textura heterogênea, com sombra, indicando a estrutura florestal complexa e não alterada.	Floresta não alterada
	Tonalidade magenta, ou verde muito claro (esmaecido). Forma regular, textura lisa, limites bem definidos entre o polígono (solo exposto) e a matriz florestal.	Predomínio de solo exposto ou pastagem em formação.	Corte Raso
	Predomínio de tonalidade verde e padrão de floresta, com presença de feições de tonalidade magenta ou roxa de tamanho pequeno, com baixa densidade e freqüência.	Predomínio de cobertura florestal com manchas de solo exposto indicando a presença de pátios e indícios de acesso.	Floresta Degradada de Intensidade Leve
	Predomínio de tonalidade verde e padrão de floresta, com presença de feições de tonalidade magenta ou roxa, de tamanho médio, com média densidade e freqüência.	Predomínio de cobertura florestal com manchas de solo exposto indicando a presença de pátios de estocagem de madeira, ramais e clareiras.	Floresta Degradada de Intensidade Moderada
	Predomínio de tonalidade magenta/roxa (clareiras grandes com indicação de fogo) ou verde (com textura lisa) em associação com manchas que apresentam padrão de floresta.	Presença de grandes clareiras com solo exposto, vegetação secundária e/ou área extensa de cicatriz de fogo florestal, combinadas com manchas florestais.	Floresta Degradada de Intensidade Alta

Figura 2. Critérios utilizados para a qualificação dos dados do DETER. Padrões de desflorestamento em imagens TM/Landsat, descrições e classes associadas.

2. QUALIFICAÇÃO DOS ALERTAS DE JUNHO DE 2009

A área desmatada apontada pelos Alertas do DETER no mês de junho foi de 578,6 km² detectados em 317 polígonos. A distribuição do desmatamento por Estado é apresentada na Figura 3.




Figura 3. Distribuição dos desmatamentos do mês de junho por Estado.

Os dados do DETER devem ser analisados em conjunto com os dados de distribuição de nuvens, como os apresentados nas Figuras 4 e 5. A área observada livre de cobertura de nuvens no mês de junho correspondeu a 57% da Amazônia Legal. Estados como o Amapá, Amazonas e Roraima não puderam ser monitorados adequadamente, pois apresentaram um alto índice de cobertura de nuvens no período, de 96%, 70% e 94%, respectivamente. O estado do Mato Grosso foi o que apresentou melhor oportunidade de observação (100%), entretanto, o estado do Pará, que pela primeira vez em 2009 apresentou pouco mais da metade de sua área (51%) livre de cobertura de nuvens, foi o que apresentou a maior área de Alertas.




Figura 4. Distribuição dos Alertas do mês de junho de 2009.




Figura 5. Cobertura de nuvens e Cenas TM/Landsat utilizadas para qualificação dos Alertas do mês de junho de 2009.

A qualificação dos dados do DETER do mês de junho foi realizada utilizando como referência um conjunto de 10 cenas do sensor TM/Landsat do mês de julho de 2009. As imagens analisadas são referentes aos Estados do Mato Grosso, Maranhão, Pará e Rondônia e são listadas na Tabela 1.

Tabela 1. Cenas TM/Landsat utilizadas na avaliação do DETER de junho de 2009.

Cenas TM/Landsat	Data	Estado
222/63	09/07/2009	MA
224/69	07/07/2009	MT
224/68	07/07/2009	MT
224/67	07/07/2009	MT
224/66	07/07/2009	PA
224/65	07/07/2009	PA
227/64	12/07/2009	PA
227/65	12/07/2009	PA
227/66	12/07/2009	PA
231/67	08/07/2009	RO

Foram avaliados 118 Alertas (ou polígonos de desmatamento), representando 402,6 km² ou 69,6% da área total dos polígonos (578,6 km²) indicados pelo DETER no mês de junho. Essa amostragem foi considerada representativa e suficiente para a qualificação dos dados.

Do total da área dos Alertas avaliados, 99% foram confirmadas como desmatamento e 1% não apresentaram indícios de desmatamento nas imagens de referência. O gráfico da Figura 6 e a Tabela 2 apresentam a síntese dos resultados dessas análises.

De acordo com a Tabela 2, da área total dos Alertas confirmados como desmatamento, 60% foi classificada como corte raso e 39% como floresta degradada. As áreas classificadas como floresta degradada de alta intensidade representaram 37,5% da área dos polígonos de Alerta e as de intensidade moderada e leve, totalizaram 2,2%, demonstrando que estágios iniciais e intermediários de degradação são detectados com menos eficiência.




Figura 6. Proporção da área de Alertas qualificados como desmatamento por corte raso, degradação florestal Alta, Moderada e Leve e, não confirmados.

Tabela 2. Resultado da qualificação dos dados de junho do DETER.

	Área (km ²)	Confirmação (%)
1. Desmatamento	398,7	99,0%
1.1 Corte_raso	31,6	60,0%
1.2.Floresta_degradada_Alta	8,4	37,5%
1.3.Floresta_degradada_Moderada	1,0	0,4%
1.4.Floresta_degradada_Leve	2,9	1,1%
2. Não confirmado	3,94	1.0%
Total	402,64	

A tabela 3 e o gráfico da Figura 7 mostram o resultado da análise por área e faixas de tamanho dos Alertas. Todos os Alertas classificados como não confirmados (3,6 %) têm área menor que de 2 km² (200 ha). Esse indicador sustenta o uso dos Alertas para a fiscalização, principal objetivo do DETER, uma vez que facilita a escolha e priorização dos Alertas para a vistoria de campo. Também é possível observar na tabela 03 que no mês de junho cerca de 87,2% dos Alertas tinham área maior que 2 km² (200 ha). Nesse mês, grandes áreas de desmatamento foram detectadas, com tamanho superior a 10 km² (10.000 ha), correspondendo aos desmatamentos por corte raso (17%) e degradação florestal de alta intensidade (22,5%).

Das cenas avaliadas a que apresentou maior área desmatada (161 km²) foi a cena 227/65 que envolve o município de Novo Progresso (PA). Nessa cena mais de 95% dos desmatamentos ocorreram por corte raso. A cena 224/68 localizada na porção Nordeste do Estado do Mato Grosso, apresentou uma área de 89 km² qualificada como floresta degradada de alta intensidade, representando mais de 95% dos desmatamentos mapeados na cena.

Tabela 3. Análise dos Alertas por área e faixas de tamanho.

Classes	Faixas de Tamanho					
	<=0.5	0.5 a 1	1 a 2	2 a 5	5 a 10	>10
Km ²	1.7%	5.1%	6.0%	24.8%	22.5%	39.9%
Corte raso	1.0%	3.5%	5.1%	20.6%	12.4%	17.4%
Floresta degradada Alta	0.2%	1.1%	0.0%	3.5%	10.1%	22.5%
Floresta degradada Moderada	0.2%	0.0%	0.3%	0.7%	0.0%	0.0%
Floresta degradada Leve	0.1%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Não confirmado	0.3%	0.2%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%




Figura 7. Qualificação dos Alertas por área e faixas de tamanho.

3. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos da avaliação de junho indicam um excelente desempenho do DETER, com 99% da área dos Alertas confirmada como

desmatamento. Foram avaliados 118 polígonos de desmatamento, representando 402,6 km² ou 70% da área total dos Alertas (578,6 km²) indicados pelo DETER no mês de junho.

Os Alertas indicaram principalmente desmatamentos por corte raso (60%) e por degradação florestal de intensidade Alta (37,5%), categorias em que a resposta do solo é predominante sobre a cobertura florestal escassa. O sistema DETER foi preciso na detecção de polígonos em todas as faixas de tamanho, e teve confirmado todos os polígonos analisados com área maior que 2 km² (200 ha).

Os resultados obtidos na qualificação dos Alertas de junho mostraram-se consistentes com as avaliações realizadas para o período de agosto de 2006 a julho de 2007, as avaliações mensais e trimestrais disponíveis na página do DETER (<http://www.obt.inpe.br/deter>).